Murrão blanc

Vass6R13s071-075

ductodonionlenionleniond

ERTS & St. Xx 0Mtp760

Collection Vassal-Montpellier

Murrão blanc 6 R 13 s.71.75









NOM Murrão		EMPLACEI	EMPLACEMENT 10 R6 & 366. 370 lus Le 3/2 Luit:7						
	rrement Nb		Flora debut m		fin		mi/v	fin	Maturité
1 4 13.3 2 f 3 f 4 4 4 4 5 le \$0.3.9		Couleur Saveur Pépins	30.5  : G - P  TC - G  Risc-sph  : B-Gr  : s - m  ; avec	M - P  Mill - M -  n-ell Rs-R n - ar - apy	Dim : P E ov-oh Rg-N - fo	oov-cyl dus:	-fus inc -		: 1 ::- C

ANNEE: 1996

HOM Nurrão: blanc EMPLACMENT. 10 R6 s 366, 370

6 R 13 1.74.75.

Nore Débourgment libre Ferti- Floraison Vé

	0 10 313 317 1170											
iche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb			Ferti-	Thoraison debut mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Unturll6
1 2 3 4 5	24344	183 183 183	££,3. ££,3. ££,3.		Grappe Four : Baic :	: 9  TC - C  disc-sp  r : B-C  : s	M - P Mil G - M ch-ell Gr-Rs- m - a:	Dim  1: - P I -ov-ol Rg-N r - fo	Dim: Dov-cyl	Compacion for the compacion of the compa	cité	: I ::- C

N° d'ordre : Murrão blave
Désignation : 10 R 6 3,366.370 A.1
Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Juntandanta

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 160 - sans villosité pubescente 2/18 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 101 - fauve ou noux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttiere - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 200 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 203 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 20me et de la 30me feuille détachées sera notée).

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 28 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - sêteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

### Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 263,

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

- Calvo-92

Murrão blanc 10 R6 s. 366. 3704.1

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

Juutualunti

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

duction/potential

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 2(8) - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 2(51) - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 /- vert 265.

### (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 98

N° d'ordre :

luntum luntu

Murrão blanc 10 R6s. 366-370

Désignation : Emplacement :

### FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 / grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 2/72 - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 2/74/ - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 1/59 / gauffrée 1/60/plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164/partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 1/68/entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

## PETIOLE

Long 170 - moyen 171/- court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.

Coloré 1/76 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 9?

Formulaire de description 5/8 (maturité) Observateur Lacombe Vinnée 1358 c'ode cepage Code clone Emplacement 6 R 13 5 71-75 W 10 R61 366-370 Nom cepage: Murrão blanc Grappe oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm)(3 - moyenne (15-20cm)(5)- longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9. oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3)- moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9. oiv 204 compacité : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7- très compacte 9. oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm)(3)- moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulemen 1)- moitié 5 - plus de la moitié 7. ojy 208\* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale(2) by 209\* présence d'un aileron : absent(1) une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4. Baie oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm)(5)- longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (≥26mm) 9. oiv 222 **uniformité de la grosseur** : non uniforme ) - uniforme 3. ojy 223 forme aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique(3) - ovoide 4 - troncovoide 5 - obovoide 6 cylindrique 7 - arquée 8. oiv <u>225</u> couleur épiderme : vert jaune D- rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6. oiv 226 **uniformité couleur épiderme** : non uniforme 1 - u**nif**orme(2)

dustrological

oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - tres épaisse 9. oiv 229 ombilie : peu apparent 1 - apparent 2. oiv 230\* coloration de la pulpe : non coloree 1 - coloree 2.

oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée D coloration faible 3 - coloration moyenne 5 - torte coloration 7 - très forte coloration 9.

oiv 232 succulence pulpe: peu juteuse 1 - juteuse 2

luniting lunto

oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<05) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7. oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne(5) - élevée 7 - très élevée 9.

oiv 236 saveur : aucune 1)- goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5.

oiv 227 pruine nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte (1) très forte 9.

oiv 236\* saveur : aucune 1) - goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4.

oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.

oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 🕖 - très difficile 9

oiv 242 longueur pépins: très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9

oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) très faible (> 10mg) ± - faible (25mg) 3 - moyen (40mg) > - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins absentes / présentes ?

## Formulaire de description 5/8

deatorizatorionimineted

lundundundi

(maturité) 2002 Année : Observateur: Code cépage Code clone Nom cépage : Murrão Grappe oiv 202 longueur : très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9. oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) Sarge (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9. oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9. oiv 206 **longueur pédoncule** : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 3 - plus de la moitié 7 oiv 208\* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2 oiv 209\* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2 - deux ailes \$\beta\$ - plus de deux ailes 4 Baie oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3)- moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3. oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8. oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6 oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2. oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 3 - épaisse 7 - très épaisse 9. oiv 229 ombilic : peu apparent 1 - apparent 2 oiv 230\* coloration de la pulpe : non colorée? - colorée 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée f - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe: peu juteuse 1 - juteuse 2. oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7. oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9 oiv 236 saveur : aucune (1) - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5. oiv 236\* saveur : aucune ] - goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4. oiv 238 **longueur pédicelle**: très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 6 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9. oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3. oiv 242 longueur pépins: très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. 7 oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 -

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes Q- présentes 2.

moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9

## Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année 1999

Observateur

Code cepage w Nom cepage Murrao blanc

Emplacement: 6 R13 271.75

#### Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 aplatie 5

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée (1)

luitindiniti

oiv 103 couleur générale : jaune 1) brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gus 4

oiv 10+ lenticelles absentes ) - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence ) - présence 9

oiv 100 densité des poils dressés des entrenoeuds absence 1) présence 9

oiv 353 longueur entrenoeuds : três courts (-60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5

longs (150mm/7)- très longs (>180mm) 9

oiv 354 diamètre entrenocuds: très petit (5mm) 1 petit (8mm) 3 moyer (11mm) 5 grand (14mm) 7 - tres grand ( ·17mm) 9

## Porte-grelle

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 55! formation de cal de soudure : très faible 1 faible 3 - moyen 5 - ele e 7 - très élevé 9.

orv 553 aptitude à la rhizogenèse très faible 1 - faible 3 - moyen 5 éleve très élevé 9

Vassal

Noends aplate(1) movens 2 - saillants 3

vijaeur 4

prime 2

croissance des rameaux secondaires: Parble

# Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année

Code clone:

Observateur:

Emplacement: 10 R6 1366. 370

uluation/quiminoloniminul

Code cépage Nom cépage: Murrão blanc

Imitorlimti

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique @- aplatie 5

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence 1 - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence ? - présence 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) \$\frac{90}{20}\$- moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 32- moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

### Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

M° d'ordre: Murao Manc Désignation: GR13 171,75

Juntam boots

```
Angle des nervures
Sexe
                                    : (7) - (8) - 9
Lil/L
                                    : (10)-(11)
L2/L
                                    : (12) - (13) - (14) - 15 - 16
Nombre de lobes
                                    : (17) - (18) - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                    : (21) - (22) - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                    : 25 - (26) - (27) - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V
                                   : 266
                                    : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire :
                                    30
                                    : 31 - (32) - (33) - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - (39)
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en Û : (269) - autre : (270)
                                    : (271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                    : 40 - (41)
Dents : forme
                                    : (42) - 43 - 44
Dents (angle)
                                    : 45 - 46 - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3
                                    : 63 - 64 - (65) - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 26